

عالی	خوب	قابل قبول	ضعیف	قرار دادن لوله معده (NG) (در اتاق عمل)	
				دستها را می شوید	1
				وسایل لازم را تهیه می کند	2
				سوند معده را به مدت ۱۵ دقیقه در ظرف یخ قرار می دهد ¹	3
				سوند را باز می کند.	4
				سر بیمار را در پوزیشن مناسب قرار می دهد ²	5
				دستکش می پوشد.	6
				سوند معده را از نظر وجود شکستگی و ترک ، کنترل می نماید	7
				فاصله تقریبی بین بینی و معده را اندازه می گیرد ³	8
				سوند معده را به اندازه ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر به ژل آغشته می کند.	9
				انتهای سوند را در دست خود جمع می کند	10
				با توجه به انحناهای طبیعی بین بینی و معده ، سوند را به آرامی از بینی وارد می کند (ترجیحا سوراخ راست بینی)	11
				حلق بیمار را از نظر جمع شدن سوند در آن کنترل می کند.	12
				در صورت عدم جمع شدن سوند برای هدایت بهتر سر بیمار را پوزیشن می دهد ⁴	13
				در صورت جمع شدن سوند در فضای حلقی از لارنگوسکوپ و از انگشتان خود در دهان بیمار کمک می گیرد	14
				در صورت عدم رفع مشکل با استفاده از لارنگوسکوپ از پنس مگیل کمک میگرد ⁵	15
				از وجود سوند در معده ، اطمینان حاصل می کند ⁶	16
				سر سوند را به وسیله مورد نظر وصل می کند	17
				بیمار را در وضعیت راحت قرار می دهد	18
				سوند را با چسب به بینی ثابت می کند	19
				با بر چسب، تاریخ گذاشتن سوند را بر روی سوند ، نصب می نماید.	20
				وسایل استفاده شده را در سطل زباله میریزد.	21

¹ یا از قبل در جایی بخیال نگهداری می شود

² سر را اکستند می کند

³ از بینی تا نرمه گوش و از گوش تا استرنوم

⁴ سر را فلکس می کند

⁵ پنس را بسته وارد دهان می کند و مراقب است با آن به زبان کوچک تروما وارد نکند

⁶ ساکشن کردن

					دستکش را خارج می کند.	22
					دستها را می شوید.	23

نام و نام خانوادگی:.....

شماره دانشجویی:.....

گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان



دانشگاه علوم پزشکی

وخدمات بهداشتی درمانی همدان